











Method for synthesis of perindopril and its pharmaceutically acceptable salts**Publication number:** EP1420029**Publication date:** 2004-05-19**Inventor:** DUBUFFET THIERRY (FR); LECOUE JEAN-PIERRE (FR)**Applicant:** SERVIER LAB (FR)**Classification:****- International:** C07K5/06; C07K5/00; (IPC1-7): C07K5/06**- European:** C07K5/06A1H**Application number:** EP20030293084 20031210**Priority number(s):** EP20030293084 20031210**Also published as:** WO2005066198 (A1)
 US2007093663 (A1)
 KR20060097060 (A)
 EP1420029 (A3)
 CN1890258 (A)

more >>

Cited documents: WO0158868
 XP004202135
 XP004162348
 XP001039108
 XP001180312

more >>

Report a data error here

Abstract of EP1420029

Industrial production of perindopril (I) by reacting benzyl (2S,3aS,7aS)-octahydroindole-2-carboxylate (IIa) or benzyl (2S)-2-indoline-carboxylate (IIb) with N-((S)-1-ethoxycarbonyl-butyl)-(S)-alanine (III) then catalytically hydrogenating over palladium, the reaction of (IIa/b) with (III) is carried out in presence of specific coupling agent(s). Industrial production of (2S,3aS,7aS)-1-((2S)-2-((1S)-1-(ethoxycarbonyl)-butylamino)-propionyl)-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid (perindopril) (I) or its salt comprises: (1) reacting benzyl (2S,3aS,7aS)-octahydroindole-2-carboxylate (IIa) or benzyl (2S)-2-indoline-carboxylate (IIb) with N-((S)-1-ethoxycarbonyl-butyl)-(S)-alanine (III) in presence of a coupling agent (or coupling agent combination) (A) and optionally a base; and (2) subjecting the product to catalytic hydrogenation in presence of palladium, optionally followed by salification. (A) is selected from: (1) (1,3-dimethylaminopropyl)-3-ethyl-carbodiimide hydrochloride (optionally in combination with 1-hydroxybenzotriazole, 1-hydroxy-7-azabenzotriazole, N-hydroxysuccinimide, 3-hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine or N-hydroxy-phthalimide); or (2) combinations of dicyclohexyl carbodiimide with 1-hydroxy-7-azabenzotriazole, N-hydroxysuccinimide, 3-hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine or N-hydroxy-phthalimide.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 420 029 A2

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:

19.05.2004 Bulletin 2004/21(51) Int Cl.7: **C07K 5/06**(21) Numéro de dépôt: **03293084.4**(22) Date de dépôt: **10.12.2003**

(84) Etats contractants désignés:

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR**

Etats d'extension désignés:


AL LT LV MK

(72) Inventeurs:

- Dubuffet, Thierry
76190 Autretot (FR)
- Lecouve, Jean-Pierre
76600 Le Havre (FR)

(71) Demandeur: **LES LABORATOIRES SERVIER****92415 Courbevoie Cédex (FR)**(54) **Procédé de synthèse du perindopril et ses sels pharmaceutiquement acceptables**


(57) Procédé de synthèse industrielle du perindopril de formule (I) :



et de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de synthèse du perindopril de formule (I) :



et de ses sels pharmaceutiquement acceptables.

[0002] Le perindopril, ainsi que ses sels pharmaceutiquement acceptables, et plus particulièrement son sel de tert-butylamine, possèdent des propriétés pharmacologiques intéressantes.

Leur principale propriété est d'inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine I (ou kininase II), ce qui permet d'une part d'empêcher la transformation du décapeptide angiotensine I en octapeptide angiotensine II (vasoconstricteur), et

d'autre part de prévenir la dégradation de la bradykinine (vasodilatateur) en peptide inactif. Ces deux actions contribuent aux effets bénéfiques du perindopril dans les maladies cardiovasculaires, tout particulièrement l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque.

[0003] Le perindopril, sa préparation et son utilisation en thérapeutique ont été décrits dans le brevet européen EP 0 049 658.


[0004] Compte-tenu de l'intérêt pharmaceutique de ce composé, il était important de pouvoir y accéder avec un procédé de synthèse performant, facilement transposable à l'échelle industrielle, conduisant au perindopril avec un bon rendement, et surtout avec une excellente pureté.

Le brevet EP 0 308 341 décrit la synthèse industrielle du perindopril par couplage de l'ester benzylique de l'acide (2S, 3aS, 7aS)-octahydroindole 2-carboxylique avec l'ester éthylique de la N-[(S)-1-carboxybutyl]-(S)-alanine en présence de dicyclohexylcarbodiimide, suivie de la déprotection du groupement carboxylique de l'hétérocycle par hydrogénation catalytique.


Ce procédé présente des inconvénients liés à l'utilisation du dicyclohexylcarbodiimide.

[0005] La Demanderesse a mis au point un procédé de synthèse du perindopril qui utilise d'autres agents de couplage.

[0006] Plus spécifiquement, la présente invention concerne un procédé de synthèse du perindopril caractérisé en ce que l'on met en réaction l'ester benzylique de formule (IIa) ou (IIb) :




(IIa)



(IIb)

ou le sel d'addition de l'ester de formule (IIa) ou (IIb) avec un acide minéral ou organique, avec le composé de formule (III) :



en présence d'un agent de couplage choisi parmi les réactifs et couples de réactifs suivants :

(1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate / 1-hydroxybenzotriazole,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate/1-hydroxy-7-azabenzotriazole,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate / N-hydroxysuccinimide,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate /3-hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate / N-hydroxyphthalimide,
 dicyclohexylcarbodiimide / 1-hydroxy-7-azabenzotriazole,
 dicyclohexylcarbodiimide / N-hydroxysuccinimide,
 dicyclohexylcarbodiimide /3-hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine,
 dicyclohexylcarbodiimide / N-hydroxyphthalimide,
 O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium hexafluorophosphate,
 O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium hexafluorophosphate,
 O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate,
 benzotriazol-1-yl-oxy-tris-(diméthylamino)-phosphonium hexafluorophosphate,
 O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-uronium hexafluorophosphate,
 O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-bis(pentaméthylène)-uronium hexafluorophosphate,
 chloro-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate,
 chloro-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-formamidineum hexafluorophosphate,
 chloro-1,1,3,3-bis(pentaméthylène)-formamidineum hexafluorophosphate,
 N-éthoxycarbonyl-2-éthoxy-1,2-dihydroquinoléine,
 O-[(éthoxycarbonyl)-cyanométhylénamino]-1,1,3,3- tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate /1-hydroxybenzotriazole,
 O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate /N-méthylmorpholine,
 O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate /collidine,
 O-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 O-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate/1-hydroxy-benzotriazole,
 O-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-uronium hexafluorophosphate,
 O-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-uronium hexafluorophosphate/1-hydroxy-benzotriazole,
 O-(N-succinimidyl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 O-(N-succinimidyl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)uronium tétrafluoroborate,
 O-(N-succinimidyl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)uronium tétrafluoroborate/1-hydroxy-benzotriazole,
 O-(5-norbornène-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate, anhydride propanephosphonique,
 imide de l'acide N-hydroxy-5-norbornène-2,3-dicarboxylique,

et N-hydroxy-1,2-dihydro-2-oxo-pyridine,

en présence éventuelle d'une base,

pour conduire après hydrogénation catalytique en présence de palladium au perindopril de formule (I), que l'on transforme, si on le souhaite, en un sel pharmaceutiquement acceptable tel que le sel de tert-butylamine.

[0007] Lorsqu'on part du composé de formule (IIa), l'hydrogénation catalytique est préférentiellement effectuée sous une pression d'hydrogène inférieure à 10 bars.

[0008] Lorsqu'on part du composé de formule (IIb), l'hydrogénation catalytique est préférentiellement effectuée sous

une pression d'hydrogène comprise entre 10 et 35 bars.

[0009] L'exemple ci-dessous illustre l'invention.

Exemple 1 : (2S, 3aS, 7aS)-1-((2S)-2-((1S)-1-(Éthoxycarbonyl)-butylamino)-propionyl)-octahydro-1H-indole-2-carboxylate de benzyle :

[0010] Dans un réacteur sous agitation sont introduits 200 g du paratoluènesulfonate de l'ester benzylique de l'acide (2S, 3aS, 7aS)-octahydroindole 2-carboxylique, 65 ml de triéthylamine, 1 l d'acétate d'éthyle puis, après 10 mn d'agitation à température ambiante, 100 g de N-[(S)-carbéthoxy-1-butyl]-(S)-alanine, et 175 g de O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-uronium hexafluorophosphate. Le mélange hétérogène est ensuite porté à 30°C pendant 3h sous bonne agitation, puis il est refroidi à 0°C et filtré.

Le filtrat est ensuite lavé, puis évaporé à sec pour conduire au produit attendu.

Exemple 2 : Acide (2S, 3aS, 7aS)-1-((2S)-2-((1S)-1-(éthoxycarbonyl)-butylamino)-propionyl)-octahydro-1H-indole-2-carboxylique :

[0011] Le résidu obtenu dans le stade précédent (200 g) est mis en solution dans 200 ml de méthylcyclohexane et transféré dans un hydrogénateur, puis 26 g de charbon palladié à 5% en suspension dans 80 ml de méthylcyclohexane sont ajoutés, suivis de 640 ml d'eau.

Le mélange est ensuite hydrogéné sous une pression de 0,5 bar, à une température comprise entre 15 et 30°C, jusqu'à absorption de la quantité théorique d'hydrogène.

Après filtration du catalyseur, la phase aqueuse du filtrat est lavée par du méthylcyclohexane, puis lyophilisée pour conduire au produit attendu avec un rendement de 94%.

Exemple 3 : Sel de tert-butylamine de l'acide (2S, 3aS, 7aS)-1-((2S)-2-((1S)-1-(éthoxycarbonyl)-butylamino)-propionyl)-octahydro-1H-indole-2-carboxylique :


[0012] Le lyophilisat obtenu dans le stade précédent (200 g) est mis en solution dans 2,8 l d'acétate d'éthyle, puis 44 g de tert-butylamine et 400 ml d'acétate d'éthyle sont ajoutés.

La suspension obtenue est ensuite portée au reflux jusqu'à dissolution totale, puis la solution obtenue est filtrée à chaud et refroidie sous agitation jusqu'à une température de 15-20°C.


Le précipité obtenu est alors filtré, réempâté à l'acétate d'éthyle, séché puis broyé pour conduire au produit attendu avec un rendement de 95%.

Revendications


1. Procédé de synthèse industrielle du perindopril de formule (I)



et de ses sels pharmaceutiquement acceptables, caractérisé en ce que l'on met en réaction l'ester benzylique de formule (IIa) ou (IIb) :




(IIa)



(IIb)

ou le sel d'addition de l'ester de formule (IIa) ou (IIb) avec un acide minéral ou organique, avec le composé de formule (III) :



(III)

en présence d'un agent de couplage choisi parmi les réactifs et couples de réactifs suivants :

(1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate / 1-hydroxybenzotriazole,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate/1-hydroxy-7-azabenzotriazole,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate / N-hydroxysuccinimide,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate /3-hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine,
 (1,3-diméthylaminopropyl)-3-éthyl-carbodiimide chlorhydrate / N-hydroxyphtalimide,
 dicyclohexylcarbodiimide / 1-hydroxy-7-azabenzotriazole,
 dicyclohexylcarbodiimide / N-hydroxysuccinimide,
 dicyclohexylcarbodiimide /3-hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine,
 dicyclohexylcarbodiimide / N-hydroxyphtalimide,
 O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium hexafluorophosphate,
 O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium hexafluorophosphate,
 O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate,
 benzotriazol-1-yl-oxy-tris-(diméthylamino)-phosphonium hexafluorophosphate,
 O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-uronium hexafluorophosphate,
 O-(benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-bis(pentaméthylène)-uronium hexafluorophosphate,
 chloro-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate,
 chloro-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-formamidinium hexafluorophosphate,
 chloro-1,1,3,3-bis(pentaméthylène)-formamidinium hexafluorophosphate,
 N-éthoxycarbonyl-2-éthoxy-1,2-dihydroquinoléine,
 O-[(éthoxycarbonyl)-cyanométhylénamino]-1,1,3,3- tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate /1-hydroxybenzotriazole,
 O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate /N-méthylmorpholine,
 O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate /collidine,
 O-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate,
 O-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate/1-hydroxybenzotriazole,
 O-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-uronium hexafluorophosphate,
 O-(1,2-dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)-uronium hexafluorophosphate/1-hydroxy-benzo-

triazole,

O-(N-succinimidyl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate,

O-(N-succinimidyl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)uronium tétrafluoroborate,

O-(N-succinimidyl)-1,1,3,3-bis(tétraméthylène)uronium tétrafluoroborate/1-hydroxybenzotriazole,

O-(5-norbornène-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate, anhydride propanephosphonique,

imide de l'acide N-hydroxy-5-norbornène-2,3-dicarboxylique,

et N-hydroxy-1,2-dihydro-2-oxo-pyridine,

en présence éventuelle de base,

pour conduire après hydrogénation catalytique en présence de palladium au perindopril de formule (I), que l'on transforme, si on le souhaite, en un sel pharmaceutiquement acceptable.

2. Procédé de synthèse selon la revendication 1 du perindopril sous sa forme de sel de tert-butylamine.

3. Procédé selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** l'on part du composé de formule (IIa).

4. Procédé selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** l'on part du composé de formule (IIb).

5. Procédé selon la revendication 3, **caractérisé en ce que** la réaction d'hydrogénation est effectuée sous une pression d'hydrogène inférieure à 10 bars.

6. Procédé selon la revendication 4, **caractérisé en ce que** la réaction d'hydrogénation est effectuée sous une pression d'hydrogène comprise entre 10 et 35 bars.